



Achtergrondinformatie Bedrijfsbehandelplan

Gebruik van het bedrijfsbehandelplan

Het bedrijfsbehandelplan is een leidraad voor het juist behandelen van de verschillende aandoeningen bij rundvee. Op het bedrijfsbehandelplan kunt u in één oogopslag zien welk middel u voor welke aandoening dient te gebruiken, in welke dosering, hoe vaak, hoe lang en op welke manier u het middel moet toedienen.

Wanneer bij een aandoening “en” staat wordt er bedoeld dat u de beide middelen toedient, staat er “of” dan kunt u kiezen tussen beide middelen. Bij veel aandoeningen staat een pijnstiller genoemd. Door het verminderen van pijn houden we zieke dieren vaak beter aan het vreten, wat belangrijk is voor een optimale penswerking. Tevens heeft een pijnstillert vaak een ontstekingsremmend effect, waardoor de koe sneller geneest.

Een goede behandeling begint met de juiste diagnose

1. Beoordeel de temperatuur van het dier op de dag(-en) van behandelen en 24 uur na behandeling.
2. Beoordeel de eetlust.
3. Beoordeel de melkgift.
4. Beoordeel of het dier vlot kan staan en lopen.
5. Controleer bij staande maar ook bij liggende zieke koeien altijd alle kwartieren van de uier.

Diergeneesmiddelengebruik

1. Voor melkveebedrijven is het kwaliteitsborgingssysteem van de betrokken zuivelonderneming van toepassing.
2. Gebruik alleen geregistreerde diergeneesmiddelen.
3. Gebruik 3e keus middelen alleen als dit echt noodzakelijk is, na overleg met de dierenarts.
4. Vóór dat u de koe behandelt het dier merken of in de robot aangeven dat de melk gesepareerd wordt.
5. Schakel bij twijfel altijd de dierenarts in.
6. Maak de behandeling altijd af volgens voorschrift ook al lijkt het dier beter, om resistentie te voorkomen.
7. Gebruik alleen combinaties van diergeneesmiddelen als uw dierenarts dit adviseert.
8. Verander pas van middel als uw dierenarts dit adviseert.
9. Houd de wachttijden in acht om te voorkomen dat residunormen voor melk en vlees overschreden worden.
10. Bij herhalingsgevallen of tegenvallende resultaten, neem contact op met de dierenarts.

Diergeneesmiddeladministratie

1. Volg de regels van het kwaliteitsborgingssysteem.
2. Naam en nummer dier.
3. Aandoening waarvoor is behandeld.
4. Naam diergeneesmiddel, RegNL nummer en batchnummer.
5. Datum toediening.
6. Gebruikte hoeveelheid per dag.
7. Aantal dagen behandeld.
8. Einde wachttijd na laatste toediening.
9. Toediener.
10. Leverancier van het diergeneesmiddel.
11. Zorg dat de administratie altijd inzichtelijk is zodat een vervanger direct kan zien welke dieren behandeld zijn.

Bewaaradviezen diergeneesmiddelen


1. Kijk op de verpakking en/of bijsluiter.
2. Noteer de aanprikdatum op het flesje.
3. Beperk de voorraad.
4. Bewaar buiten het bereik van kinderen.
5. Verkeerd bewaren (vochtig of verkeerde temperatuur) kan de werkzaamheid en de diergezondheid benadelen.

Wijze van toedienen: injectie met een spuit en naald

1. Gebruik voor iedere behandeling een schone spuit en een schone en scherpe naald.
2. Zorg dat het flesje met medicijn dat u aanprikst schoon is.
3. Spuit geen medicijn in het flesje terug.
4. Injecteer het dier op een droge plek zonder mest
5. Injecteer per injectieplaats niet meer dan 20 ml. Afhankelijk van het middel kan dit nog lager zijn.
6. De plaats voor injectie ligt in een driehoek die wordt gevormd door het schouderblad, de boog van de halswervels en de lijn van oren naar boeg. Blijf hier overal een handbreedte vandaan (afbeelding 1).

Toediening onder de huid (subcutaan (sc))

1. Gebruik een korte naald.
2. Zorg dat het dier goed vast staat.
3. Til de huid met de ene hand op en steek de naald schuin in de ontstane plooi.
4. Duw de spuit leeg, haal de naald uit de huid en laat de huidplooi terugvallen.
5. Masseer de injectieplek na met de muis van de hand.
6. Reinig de spuit en gooi de naald weg op een veilige plaats.




Afbeelding 1: Plaats voor injecties in de spier of onder de huid

Toediening in de spier (intramusculair (im))

1. Zorg dat het dier goed vast staat.
2. Steek de naald van de spuit recht in de spier in de driehoek op afbeelding 1.
3. Duw de spuit leeg, haal de naald uit het dier.
4. Reinig de spuit en gooi de naald weg op een veilige plaats.

Bij toediening in de uier (intramammair)

1. Gebruik schone handschoenen.
2. Melk enige stralen weg.
3. Ontsmet de speen met ontsmettingsdoekjes en neem een melkmonster voor een eventueel later bacteriologisch onderzoek.
4. Trek het kwartier/ de uier leeg.
5. Zorg ervoor dat de injector een korte punt heeft.
6. Zorg dat de punt van de injector niet ergens anders mee in contact komt dan het slotgat van de schone speen.
7. Breng de injector in en druk hem leeg.
8. Desinfecteer de speen.
9. Lees de bijsluiters van de betreffende injector of masseren of uitmelken noodzakelijk is.



Afbeelding 2: Desinfecteren en het inbrengen van de uierinjector.

Bij toediening in de bek (oraal)

Dien geen middel in de bek toe, bij een dier dat door zwakte (bijvoorbeeld melkziekte), niet kan staan. De kans op verslikken is groot.

Vloeistof

1. Gebruik voor het toedienen van vloeistoffen in de bek een fles die niet van glas is.
2. Zet de koe vast zodat de bek van de koe omhoog kan.
3. Neem de kop van het dier onder de arm en doe met deze hand de bek open (niet met de hand tussen de kiezen komen) en doe de fles met de andere hand midden in de bek.
4. Vaak zal de koe de kop omhoog gooien en zal de vloeistof naar de keelholte lopen.
5. Stop de toediening als de koe gaat hoesten. Veel vloeistoffen (in het bijzonder met Calcium) zijn schadelijk voor de longen.

