

Bedrijfsbehandelplan geit

Lammeren		Dosering	Frequentie per dag	Duur in aantal dagen	Toedieningswijze	Wachttijd in dagen	Vlees
Diarree							
Euroelectrol	RegNL 1286 vrij	100 ml per dier	6x	1	In de bek		0
<i>Tweede keuze</i>							
Belcomix	RegNL 3264 UDA	100 ml per dier	6x	1	In de bek		28
Cryptosporidiose Na bevestiging diagnose (in overleg met dierenarts) behandeling inzetten							
Coccidiose (>3 weken leeftijd)							
Vecoxan	RegNL 9660 URA	1 ml/ 2,5 kg	éénmalig		In de bek		28
Baycox bovis	RegNL 10427	3 ml/ 10 kg	éénmalig		In de bek		28
Ontstoken navel							
Albipen LA	RegNL 7828 UDA	1,5 ml/ 10 kg	1x in 2 dgn	7	Onder de huid		28
Gewrichtsontsteking							
Depocilline	RegNL 4259 UDA	1 ml/ 20 kg	1x	7	Onder de huid		28
Hersenvliesontsteking							
Depocilline en	RegNL 4259 UDA	1 ml/ 20 kg	1x	7	Onder de huid		28
Rimadyl Cattle of	RegNL 10130 UDA	1 ml/ 33 kg	1x	1	Onder de huid		28
Voreen suspensie	RegNL 2875 UDA	1 ml/ 50 kg	1x	1	Onder de huid		55
Zere bekjes							
CTC Spray	RegNL 9013 UDA	3 sec sprayen	2x	3	Op de huid		28
<i>Bij ernstig zieke dieren</i>							
Terramycin LA	RegNL 7691 UDA	1 ml/ 10 kg	1x	1	Onder de huid		27
Longontsteking							
Terramycin LA en	RegNL 7691 UDA	1 ml/ 10 kg	1x	1	Onder de huid		27
Rimadyl Cattle	RegNL 10130 UDA	1 ml/ 33 kg	1x	1	Onder de huid		28
<i>Tweede keuze</i>							
Albipen LA en	RegNL 7828 UDA	1,5 ml/ 10 kg	1x in 2 dgn	7	Onder de huid		28
Rimadyl Cattle	RegNL 10130 UDA	1 ml/ 33 kg	1x	1	Onder de huid		28

Alle bovengenoemde middelen met uitzondering van Terramycine LA zijn niet geregistreerd voor het gebruik bij geiten. Dit betekent dat gebruik van deze middelen bij geiten off-label is en dat dan de daarbij behorende wachttijden in acht genomen dienen te worden.

Lees altijd goed de bijsluiter, wachttijden kunnen wijzigen.

Actualisatiedatum: augustus 2011

Ooien	Dosering	Frequentie per dag	Duur in aantal dagen	Toedienings- wijze	Wachttijd in dagen	
					Melk	Vlees
Longontsteking						
Terramycin LA en <small>RegNL 7691 UDA</small>	1 ml/ 10 kg	1x	1	Onder de huid	13	27
Rimadyl Cattle <small>RegNL 10130 UDA</small>	1 ml/ 33 kg	1x	1	Onder de huid	7	28
<i>Tweede keuze</i>						
Albipen LA en <small>RegNL 7828 UDA</small>	1,5 ml/ 10 kg	1x in 2 dgn	7	Onder de huid	7	28
Rimadyl Cattle <small>RegNL 10130 UDA</small>	1 ml/ 33 kg	1x	1	Onder de huid	7	28
Uierontsteking						
Mamyzin 5 gr <small>RegNL 8652 UDA</small>	0,25 flesje/dier	1x	2	Onder de huid	7	28
<i>Tweede keuze</i>						
Terramycin LA <small>RegNL 7691 UDA</small>	1 ml/ 10 kg	1x	1	Onder de huid	13	27
<i>Ontstekingsremmer</i>						
Rimadyl Cattle <small>RegNL 10130 UDA</small>	1 ml/ 33 kg	1x	1	Onder de huid	7	28
Baarmoederontsteking						
Nageboorte pil <small>RegNL 8260 UDA</small>	1 pil	1x	1	In de baarmoeder	7	28
<i>Bij koorts</i>						
Terramycin LA <small>RegNL 7691 UDA</small>	1 ml/ 10 kg	1x	1	Onder de huid	13	27
Oogontsteking						
Rimadyl Cattle <small>RegNL 10130 UDA</small>	1 ml/ 33 kg	1x	1	Onder de huid	7	28
Hersenvliesontsteking						
Depocilline en <small>RegNL 4259 UDA</small>	1 ml/ 20 kg	1x	7	Onder de huid	7	28
<i>Ontstekingsremmer</i>						
Rimadyl Cattle of <small>RegNL 10130 UDA</small>	1 ml/ 33 kg	1x	1	Onder de huid	7	28
Voreen suspensie <small>RegNL 2875 UDA</small>	1 ml/ 50 kg	1x	1	Onder de huid	7	55
Schijndracht						
Genestranvet <small>RegNL 10280 UDA</small>	1 ml/ dier	1x	Na 10 dgn herhalen	Onder de huid	7	28
Ontstoken wond						
Albipen LA <small>RegNL 7828 UDA</small>	1,5 ml/ 10 kg	1x in 2 dgn	7	Onder de huid	7	28
Slepende melkziekte						
Propyleen glycol <small>RegNL 2628 vrij</small>	30 ml	2x	4	In de bek	0	0
Pijnstilling						
Rimadyl Cattle <small>RegNL 10130 UDA</small>	1 ml/ 33 kg	1x	1	Onder de huid	7	28

Alle bovengenoemde middelen met uitzondering van Terramycine LA zijn niet geregistreerd voor het gebruik bij geiten. Dit betekent dat gebruik van deze middelen bij geiten off-label is en dat dan de daarbij behorende wachttijden in acht genomen dienen te worden.

NB! Indien de bijsluiter voor geiten geen dosering aangeeft, maar wel voor andere herkauwers, wordt i.v.m. de stofwisseling van volwassen geiten uit te worden gegaan van 1.5 maal de aangegeven dosering.

Lees altijd goed de bijsluiter, wachttijden kunnen wijzigen.

Actualisatiedatum: augustus 2011