

## Bedrijfsbehandelplan schaap

Lammeren	Dosering	Frequentie per dag	Duur in aantal dagen	Toedieningswijze	Wachttijd in dagen	
					Melk	Vlees
<b>Diarree (eerste levensweken)</b>						
<b>Eurolectrol</b>	RegNL 1286 vrij 100 ml per dier	6x	1	In de bek		0
<i>Tweede keuze</i>						
<b>Belcomix</b>	RegNL 3264 UDA 100 ml per dier	6x	1	In de bek		28

### Diarree

Vanaf een leeftijd van 3 weken is coccidiose een veel voorkomende oorzaak van diarree bij lammeren. Vanaf een leeftijd van 6 weken kunnen worminfecties de oorzaak zijn. Coccidiose en een worminfectie kunnen aangetoond worden in de mest. Laat eerst mestonderzoek doen op de praktijk en behandel op basis van de uitslag!

Als de lammeren niet meer drinken, dierenarts bellen voor advies. Vocht is essentieel voor de lammeren, zonodig via een sonde of infuus. Belangrijk is de lammeren melk te blijven geven, afgewisseld met de electrolytenoplossing. Geef de lammeren het vocht in kleine hoeveelheden: 100-150 ml per keer, 6-8 per dag.

### Ontstoken navel

<b>Albipen LA</b>	RegNL 7828 UDA 1,5 ml/ 10 kg	1x in 2 dgn	7	Onder de huid		28
-------------------	------------------------------------	-------------	---	---------------	--	----

### Gewrichtsontsteking

<b>Albipen LA</b>	RegNL 7828 UDA 1,5 ml/ 10 kg	1x in 2 dgn	7	Onder de huid		28
-------------------	------------------------------------	-------------	---	---------------	--	----

### Zere bekjes

<b>CTC Spray</b>	RegNL 9013 UDA 3 sec sprayen	2x	3	Op de huid		0
<b>Depocilline</b>	RegNL 4259 UDA 1 ml/ 20-25 kg	1x	5	Onder de huid		7

De infectie gaat vanzelf over en meestal hoeft er niet of alleen met CTC-Spray behandeld te worden. Alleen ernstige gevallen behandelen met depocilline. Handschoenen dragen bij het behandelen van de dieren om infectie van uzelf te voorkomen.

## Lammeren & Ooien

### Longontsteking

<b>Depocilline en</b>	RegNL 4259 UDA 1 ml/ 20-25 kg	1x	5	Onder de huid	4	7
<b>Voreen suspensie</b>	RegNL 2875 UDA 1 ml/ 50 kg	1x	1	Onder de huid	5	55
<i>Tweede keuze</i>						
<b>Engemycine 10% of</b>	RegNL 8291 UDA 1 ml/ 12,5 kg	1x	3	Onder de huid	5	18
<b>Albipen LA</b>	RegNL 7828 UDA 1,5 ml/ 10 kg	1x in 2 dgn	7	Onder de huid	7	28
<b>en Voreen suspensie</b>	RegNL 2875 UDA 1 ml/ 50 kg	1x	1	Onder de huid	5	55

Als schapen longontsteking hebben, is het meestal zomerlongontsteking. Dieren sterven hier vaak binnen een dag aan. Raadpleeg bij plots dode dieren en/of verdenking van zomerlongontsteking altijd de dierenarts. Vaccineren tegen zomerlongontsteking is mogelijk.

### Pijnstilling

<b>Rimadyl Cattle</b>	RegNL 10130 UDA 1 ml/ 35 kg	1x	1	Onder de huid	7	28
-----------------------	-----------------------------------	----	---	---------------	---	----

Lees altijd goed de bijsluiter, wachttijden kunnen wijzigen.

Actualisatiedatum: augustus 2011

Ooien	Dosering	Frequentie per dag	Duur in aantal dagen	Toedieningswijze	Wachttijd in dagen	
					Melk	Vlees
<b>Diarree</b>						
<b>Ivervet</b> <small>RegNL 10547 URA</small>	0,5 ml/ 25 kg	éénmalig		Onder de huid	0	63
Diarree bij volwassen dieren wordt meestal veroorzaakt door een worminfectie. Worminfecties kunnen aangetoond worden in de mest. Laat mestonderzoek doen op de praktijk en behandel op basis van de uitslag! Regelmatig omweiden kan worminfecties voorkomen. Vraag uw dierenarts om advies!						
<b>Uierontsteking</b>						
<b>Engemycine 10% en</b> <small>RegNL 8291 UDA</small>	1 ml/ 12,5kg	1x	3	Onder de huid	5	18
<b>Rimadyl Cattle</b> <small>RegNL 10130 UDA</small>	1 ml/ 33 kg	1x	1e dag	Onder de huid	7	28
<i>Tweede keuze</i>						
<b>Mamyzin en</b> <small>RegNL 8652 UDA</small>	5 gram (1 flesje)	1x	1e dag	Onder de huid	7	28
	2,5 gram (0,5 flesje)	1x	2e,3e dag	Onder de huid	7	28
<b>Rimadyl Cattle</b> <small>RegNL 10130 UDA</small>	1 ml/ 33 kg	1x	1e dag	Onder de huid	7	28
Uierinjectoren bestemd voor runderen kunnen gebruikt worden (Curaclox 2x/dg, min 3x) maar kunnen ook het slotgat beschadigen en secundaire infecties veroorzaken. Rimadyl bijspuiten als pijnstiller en ter bevordering van de eetlust.						
<b>Blauw uier</b> Acuut, uierheft koud en blauw. Overleg met dierenarts.						
<b>Baarmoederontsteking</b>						
<b>Nageboorte pil</b> <small>RegNL 8260 UDA</small>	1 pil	1x	1	In de baarmoeder	7	28
<i>Tweede keuze</i>						
<b>Albipen LA</b> <small>RegNL 7828 UDA</small>	1,5 ml/ 10 kg	1x in 2 dgn	7	Onder de huid	7	28
<b>Ontstoken wond</b>						
<b>Depocilline</b> <small>RegNL 4259 UDA</small>	1 ml/ 20-25 kg	1x	3	Onder de huid	4	7
<i>Tweede keuze</i>						
<b>Albipen LA</b> <small>RegNL 7828 UDA</small>	1,5 ml/ 10 kg	1x in 2 dgn	7	Onder de huid	7	28
<b>Slepende melkziekte</b>						
<b>Propyleenglycol</b> <small>RegNL 2628 vrij</small>	30 ml per dier	2x	4	In de bek	0	0
Bij schapen die zeer ernstige slepende melkziekte hebben kan evt. het lammeren opgewekt worden. Overleg hierover met de dierenarts.						
<b>Rotkreupel</b>						
<b>CTC Spray</b> <small>RegNL 9013 UDA</small>	3 sec sprayen	2x	3	Op de huid	0	0
<i>Bij ernstige gevallen:</i>						
<b>Linco-spectin</b> <small>RegNL 9825 UDA</small>	1 ml/ 10 kg	1x	3	Onder de huid	7	15
Aanvullende maatregelen zijn: klauwtjes bekappen, dieren naar droge, schone stal/wei en evt. enten.						
<b>Oogontsteking</b>						
<b>Opticlox</b> <small>RegNL 3432 UDA</small>		3-4x	3	In het oog	0	0
Dieren met oogontsteking kunnen het beste apart van de rest gezet worden, en in de stal omdat ze niet goed tegen fel licht kunnen. Behandeling met antibiotica heeft niet altijd effect. Bij ernstige oogontsteking wel een pijnstiller spuiten (Rimadyl). Let op dat de dieren, doordat ze slecht zien, niet verdrinken.						

Lees altijd goed de bijsluiters, wachttijden kunnen wijzigen.

Actualisatiedatum: augustus 2011