

Openingstijden voor ophalen van medicijnen:
Maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00.

Voor visites en spoedgevallen kunt u ons bereiken op:
0348- 442653




DIERGEENEESKUNDIG CENTRUM

"Het Westelijk Weidegebied"

April 2006, nummer 3



Nieuwsbrief kleine herkauwer



Inleiding

Voor de meesten van u zit het aflammerseizoen er inmiddels op en zullen de wallen onder de ogen spoedig weer wegtrekken onder invloed van het voorjaarszonnetje.

Er breekt weer een rustigere tijd aan voor de meeste schapenhouders, maar ook in het komende kwartaal zijn er weer een aantal zaken waar extra aandacht aan besteed moet worden.

Zo zien we elk jaar weer schapen met myiasis, lammeren die sterven ten gevolge van 't Bloed of Zomerlongontsteking en krijgen we elk jaar vragen over het ontwormen van schapen en geiten. Met name op gebied van het laatst genoemde onderwerp zijn de inzichten aan het veranderen en is overleg aan te bevelen.

Myiasis (Vliegenlarveziekte)

Zodra het weer wat beter wordt moet men bedacht zijn op de aanwezigheid van maden (vliegenlarven) bij de schapen. De groenblauwe vlieg legt haar eitjes bij voorkeur in de wol van schapen waarvan de achterhand met mest besmeurd is. De ziekte kan ook worden gezien bij "schone" schapen. Bij uitkomst uit de eitjes vreten de maden zich letterlijk een weg door een schaap.

In geval van myiasis geldt dat voorkomen beter is dan genezen. In Nederland is alleen Klik geregistreerd om schapen te beschermen tegen myiasis. Dit middel dient twee weken voor het begin van de gevoelige periode te worden aangebracht op de huid en werkt ongeveer 4 maanden.

Ontwormen van schapen en lammeren

Er zijn de laatste jaren een aantal nieuwe inzichten ontstaan in het bestrijden van maag- en darmwormen bij schapen en geiten. Om in de toekomst het houden van kleine herkauwers mogelijk te houden is het voorkomen van resistentie tegen ontwormingsmiddelen van groot belang.

Schapen hoeven in de regel maar tweemaal per jaar te worden ontwormd (indien ze regelmatig worden omgeweid). Eenmaal als de schapen na het aflammeren naar buiten gaan en eenmaal voordat de schapen bij de ram worden gelaten. Deze tweede ontworming kan goed worden gecombineerd met een behandeling tegen leverbot.

Het ontwormen van lammeren is daarentegen een stuk ingewikkelder. Zo kunnen er verschillende verwekkers (virussen, bacteriën, parasieten, etc.) verantwoordelijk zijn voor sterfte en diarree bij lammeren (afhankelijk van leeftijd, tijd van het jaar, etc). Het is daarom verstandig om lammeren pas na overleg en mestonderzoek te ontwormen.

Bij het ontwormen van lammeren is het belangrijk om de juiste dosering toe te passen. Daarom is het verstandig om de zwaarste lammeren te wegen en die bijbehorende dosering voor alle lammeren te hanteren (tenzij er teveel verschil in gewicht tussen de lammeren zit).

Scheren van schapen

Tegenwoordig worden al veel schapen in de periode voorafgaande aan het aflammerseizoen geschoren. Voor de schapen die in de zomermaanden worden geschoren gelden nog een aantal algemene tips. Zo is het verstandig om de schapen een dag te laten vasten voordat ze worden geschoren. Zo kan scheerziekte worden voorkomen. In grote koppels bestaat tevens het gevaar dat de schapen hun lammeren niet meer kennen na het scheren. Zorg tevens dat pasgeschoren schapen in de schaduw kunnen schuilen voor de zon, in verband de kans op verbranding.

Het Bloed en zomerlongontsteking

In de aankomende periode is het mogelijk dat lammeren plotseling sterven. Vaak sterven deze lammeren ten gevolge van 't Bloed of Zomerlongontsteking. Het loont in geval van een sterftegeval om de diagnose te laten stellen door middel van sectie. Bij het vaststellen van een van beide aandoeningen kunnen de overige lammeren door middel van een enting beschermd worden tegen beide aandoeningen.