



Nieuwsbrief Kleine Herkauwer

April 2008

Voor de meesten van u zal het aflammerseizoen er inmiddels weer op zitten. Wij hopen dat uw lammerij aan de verwachtingen heeft voldaan. Komende zomer zal een spannende tijd worden in verband met de ziekte blauwtong en de vaccinatie daartegen. Een aandoening die we de komende maanden weer zullen tegenkomen is myiasis (vliegenlarveziekte). Op dinsdag 1 juli organiseren wij voor de houders van kleine herkauwers een informatieve avond over de ziekte Blauwtong en ontwormen van geiten/schape. Piet Vellema, specialist Gezondheidszorg Kleine Herkauwers, zal de spreker zijn.

Vaccinatie tegen Blauwtong

Komende zomer kunnen we herkauwers in Nederland kunnen gaan vaccineren tegen Blauwtong. Op dit moment ziet het er naar uit dat er onvoldoende entstof (6 miljoen dosis) voor alle herkauwers in Nederland (10 miljoen stuks) zal zijn. Komende maand zult u een extra nieuwsbrief van ons ontvangen met daarin de adviezen met betrekking tot de Blauwtong-vaccinatie. **Echter, het is belangrijk om nu al te controleren of wij als uw dierenartspraktijk geregistreerd staan bij de GD! (0900-1770).** Het vaccin zal namelijk worden toegewezen naar ratio van het aantal dieren dat er in een praktijk aanwezig is. Deze gegevens verschaft de GD aan de overheid. Op deze wijze hopen wij zoveel mogelijk vaccin toegewezen te krijgen, zodat wij aan ieders vaccinatie-wensen kunnen voldoen.

Wolschurft en luizen

De laatste maanden komen we steeds meer schape en geiten met huidproblemen en ten gevolge daarvan jeuk tegen. Vaak wordt de jeuk veroorzaakt doordat er parasieten in de wol zitten. Een mogelijke oorzaak is wolschurft. Deze aandoening wordt veroorzaakt door een bloedzuigende mijt. De diagnose kan worden gesteld door een monster van de wol met wat aangetaste huid te onderzoeken. Wolschurft is een zeer lastig te bestrijden aandoening. Het is daarom erg belangrijk om de behandeling zeer secuur uit te voeren. De behandeling bestaat uit het tweemaal inspuiten van een ivermectine-preparaat in de juiste dosering (liever iets te hoog dan te laag) met een tussentijd van 10-14 dagen. Daarnaast is het verstandig om de aangedane dieren ook te wassen met een insecticide.

Myiasis

De laatste jaren komen we steeds meer myiasis bij schape tegen. Myiasis is een aandoening die we meestal in een warme en vochtige periode zien. Mogelijk waar te nemen symptomen zijn: onrust, afzonderen van het koppel, veel liggen en kwispelen met de staart. Indien een schaap lijdt aan myiasis moet het gewassen worden met een insecticide. Myiasis kan ook worden voorkomen. Voorkomen van een vieze achterhand is daar een voorbeeld van. Er bestaat ook een middel dat preventief erg goed werkt tegen myiasis.

Informatieavond Blauwtong-vaccinatie en ontwormen

Op dinsdag 1 juli organiseren wij een avond waarop wij u als schapehouder willen informeren over de vaccinatie tegen Blauwtong. Het is de bedoeling om op deze avond een plan op te stellen om zo snel en efficiënt mogelijk zoveel mogelijk kleine herkauwers binnen onze praktijk te vaccineren. Wij hebben hiertoe Dr. Piet Vellema, specialist Gezondheidszorg Kleine Herkauwer, werkzaam bij de Gezondheidsdienst te Deventer, uitgenodigd om op deze avond te komen spreken. Naast de vaccinatie tegen Blauwtong zal de heer Vellema "Effectief ontwormen van schape en geiten" bespreken. Meer informatie over deze avond zult u later van ons krijgen, maar zet de datum voor deze interessante avond in elk geval in uw agenda!

Voor visites en spoedgevallen kunt u ons bereiken op: 0348- 442653
Openingstijden voor ophalen van medicijnen: maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u één van onze dierenartsen raadplegen tijdens het telefonisch spreekuur op bovenstaand telefoonnummer (op werkdagen van 08:00 tot 09:00 uur)