



UNIVERSITAIRE
LANDBOUWHUISDIEREN
PRAKTIJK

WESTELIJK WEIDEGEBIED

NIEUWSBRIEF KLEINE HERKAUWER

April 2010

Inmiddels zal voor de meesten het aflammerseizoen vrijwel voorbij zijn of zullen hooguit enkele ooilammeren nog moeten aflammeren. Hopelijk gaat de volgende spreuk die vaak in het aflammerseizoen geldt niet op: "Bij de eerste gaat er wat fout en bij de laatste!" Kortom blijf alert op die laatste verlossing, want die blijft toch meestal het langst in het geheugen achter...

Komende periode is er weer een aantal zaken waar aandacht aan besteed moet worden. Ondanks dat 2009 het eerste blauwtongvrije jaar was, zou de vaccinatie tegen deze virusinfectie niet moeten worden overgeslagen. Een ander jaarlijks terugkerend probleem is diarree bij opgroeiende lammeren. Iets wat we in ons praktijkgebied de laatste tijd meer tegen komen is wolschurft; een zeer lastig te behandelen aandoening. Tot slot is preventie tegen myiasis aan te bevelen. Kortom een nieuwe periode met uitdagingen om de lammeren zo snel en goed mogelijk te laten opgroeien.

Blauwtong

In 2006 en 2007 heeft de ziekte blauwtong voor aanzienlijke sterfte in de schapenhouderij gezorgd. In 2008 is er (gelukkig) een vaccin op de markt gekomen en in 2009 is helemaal geen blauwtong aangetoond in Nederland. Blauwtong is een virusinfectie die wordt overgebracht door de knut. Virusinfecties zijn slecht te behandelen en daarom geldt: Voorkomen is beter dan genezen. Ook komend jaar adviseren wij om uw dieren te laten vaccineren tegen blauwtong, want de huidige populatie is steeds minder goed beschermd en problemen zoals we die in 2007 rondom Utrecht hebben gezien zouden we moeten voorkomen.

Lammeren kunnen worden gevaccineerd vanaf een leeftijd van 1 maand en een eenmalige vaccinatie volstaat. Schapen die al eerder gevaccineerd zijn hoeven ook maar eenmalig te worden gevaccineerd. Geiten die nooit eerder zijn gevaccineerd, moeten tweemaal gevaccineerd worden, met een interval van 3-4 weken.

Diarree bij opgroeiende lammeren

Diarree kan bij opgroeiende lammeren voor aanzienlijke groeivertraging zorgen. Diarree kan worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, parasieten of verkeerde voeding. Bacteriën en virussen kunnen in de eerste levensweken problemen veroorzaken. Vanaf een leeftijd van drie weken kunnen coccidiën en wormen diarree veroorzaken. Later in de opfokperiode zijn er weer andere wormen die groeivertraging kunnen geven. Wanneer een parasitaire infectie (wormen of coccidiën) wordt vermoed is het belangrijk om mestonderzoek te laten uitvoeren. De bestrijding van de verschillende parasieten is verschillend en daarom is het stellen van een diagnose belangrijk!! Diarree door voedingsfouten is moeilijk aan te tonen, maar wordt meestal gezien bij lammeren die moederloos opgroeien.

Wolschurft

Wolschurft is een ziekte die wordt veroorzaakt door een mijt. Deze aandoening geeft behoorlijke jeuk en wolvitval. De jeuk kan zo heftig zijn, dat de dieren onvoldoende voer gaan opnemen, hierdoor vermageren en zelfs kunnen sterven. Afgelopen jaar is landelijk melding gemaakt van het meer voorkomen van wolschurft. Ook bleek de aandoening moeilijker te bestrijden te zijn, mogelijk ten gevolge van resistentie van de mijt tegen de gebruikte middelen. In de afgelopen maanden hebben we wolschurft ook meer in ons praktijkgebied gezien en alertheid is geboden op deze ziekte!

De diagnose wolschurft is te stellen door de mijt aan te tonen in de wol, die geplukt is op de overgang van gezonde naar aangedane huid. De behandeling is lastig en moet zeer secuur worden uitgevoerd. De mijt is in de korsten op de huid voor bestrijdingsmiddelen moeilijk bereikbaar en kan in wolresten aan bijvoorbeeld hekken aanwezig blijven. De aandoening komt een koppel vaak binnen door aankoop van een besmet dier. Het is daarom altijd aan te raden een aangekocht dier minimaal 4 weken in quarantaine te houden voor het bij het koppel te laten.

Myiasis

Vliegenlarveziekte (myiasis) kan tegenwoordig zeer goed worden voorkomen. Voor advies kunt u bij ons terecht!

Voor visites en spoedgevallen kunt u ons bereiken op: 0348- 442653

Openingstijden voor ophalen van medicijnen: maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u één van onze dierenartsen raadplegen tijdens het telefonisch spreekuur op bovenstaand telefoonnummer (op werkdagen van 08:00 tot 09:00 uur)