

Openingstijden voor ophalen van medicijnen:
Maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00.

Voor visites en spoedgevallen kunt u ons bereiken op:
0348- 442653




DIERGEENEESKUNDIG CENTRUM

"Het Westelijk Weidegebied"

Januari 2007, nummer 6



Nieuwsbrief kleine herkauwer



Inleiding

Om te beginnen willen wij iedereen de beste wensen voor 2007 overbrengen!

In het komende kwartaal staat het aflammerseizoen weer centraal. Vrijwel alle schapenhouders zijn weer vol verwachting hoe de fokkerij er dit jaar uit zal zien.

In deze aflevering zullen de mogelijke vaccinaties om uw schapen en lammeren te beschermen tegen een aantal aandoeningen in een aparte bijlage worden besproken

De belangrijkste oorzaken van sterfte bij pasgeboren lammeren komen aan de orde.

De voeding van de hoogdrachtige ooi is essentieel, een tweetal aan de dracht gerelateerde ziekten zal worden besproken.

Al deze aandoeningen zullen uitgebreider op de schapenverlosavond worden besproken, die dit jaar op dinsdag 6 februari zal worden gehouden.

Sterfte bij pasgeboren lammeren

Ieder jaar sterven er vele lammeren rondom de geboorte. Een sterftecijfer van 15% is geen uitzondering.

De belangrijkste oorzaken zijn: te laag geboortegewicht, onderkoeling en ondervoeding. Een te laag geboortegewicht van lammeren ontstaat meestal door te beperkte voeding van de hoogdrachtige ooi of bij te grote worpen .

De Schapenverlosavond:

Wegens het succes van de laatste twee jaar geprolongeerd!

Op dinsdag 6 februari zal er een praktisch gerichte avond worden georganiseerd. Er zal op deze avond extra aandacht worden geschonken aan ziekten van ooi en lam rondom de geboorte!

De kosten bedragen 25 euro pp.

Na opgave ontvangt u meer informatie.

Wees er snel bij, want er is maar beperkt plaats!!

Het is erg belangrijk dat ieder lam direct na de geboorte biest opneemt (binnen 6 uur). De eerste 24 uur moet een lam 250cc biest per kg lichaamsgewicht opnemen.

Andere veel voorkomende aandoeningen zijn "het bloed" , zomerlongontsteking, navelontsteking, "zere bekjes", maar er worden ook veel aangeboren aandoeningen gezien.

Aandoeningen bij drachtige ooiën/geiten

Bij hoogdrachtige ooiën/geiten komen we ieder jaar weer een aantal aan de dracht gerelateerde aandoeningen tegen. Een van de belangrijkste is slepende melkziekte. Deze ziekte komt voort uit een energietekort bij de ooi/geit. Deze dieren zijn vaak drachtig van een meerling. De conditie van de dieren is vaak te vet of te mager. Verschijnselen die kunnen worden waargenomen zijn: sloomheid, spiertrillingen, koude oren, niet meer in de benen kunnen komen, coma en sterfte.

Melkziekte is een andere voorkomende aandoening. Deze aandoening kan zowel voor als na het aflammeren voorkomen. De aandoening kan zowel bij oudere schapen als bij enterlingen worden gezien. Symptomen die deze dieren hebben: spiertrillingen, sloomheid, wankelende gang, niet meer in de benen komen. Bij enterlingen kan een aparte manier van lopen worden gezien. Deze gang lijkt op die van een kangoeroe.

Omdat de therapie van beide aandoeningen nogal verschillend is, maar de symptomen wel erg op elkaar lijken is het belangrijk om goed het onderscheid te maken tussen de verschillende aandoeningen.

Deze twee aandoeningen zijn belangrijke oorzaken van ziekte rondom het aflammeren. Omdat beide aandoeningen nogal voedingsafhankelijk zijn is een goede voeding van de ooi essentieel.

Andere belangrijke aandoeningen die in het aflammerseizoen worden gezien zijn: abortus, lijfbieden, uierontsteking, baarmoederontsteking en dracht met rottende lammeren.

Conclusie: Zorg aan drachtige ooi/geit is belangrijk. Met name voldoende voeding van goede kwaliteit draagt bij aan succes in de aflammertijd.

De zogenoemde liefde, aandacht en verzorging zal vele lammeren kunnen redden. Denk daarbij aan tijdig geven van biest, ontsmetten navel, opwarmen bij onderkoeling, etcetera.

Laat uw schapen/lammeren bijtijds vaccineren. Dit voorkomt veel problemen!

Raadpleeg bij twijfel uw dierenarts!!