



Januari 2009

Nu het aflammerseizoen weer aanstaande is, is het belangrijk om wat extra aandacht aan de schapen te gaan besteden. Correcte voeding van de hoogdrachtige oeien voorkomt aan de dracht gerelateerde aandoeningen. Pasgeboren lammeren verdienen extra aandacht.

Om uw lammeren weer passief te beschermen tegen bepaalde aandoeningen is het verstandig om uw schapen tijdig te laten vaccineren. In de bijlage vindt u extra informatie met betrekking tot de diverse vaccins.

Abortus

Ieder jaar worden we weer geconfronteerd met abortus bij schapen. Abortus is onder te verdelen in infectieuze en niet-infectieuze abortus. Oorzaken van niet-infectieuze abortus kunnen ziekte van het moederdier, stress, afwijkingen aan de vrucht(en), gifstoffen in het voer en verkeerd medicijngebruik zijn. Meestal betreft het een of enkele dieren die aborteren. Infectieuze oorzaken van abortus zijn Chlamydia abortus, Toxoplasmose, Listeriose, Border Disease en Q-fever. De infectieuze oorzaken zijn in veel gevallen verwekkers die van dier op mens (zoonose) worden overgedragen. Wanneer u met abortus wordt geconfronteerd is het belangrijk dat er een diagnose wordt gesteld. Hiertoe dienen vrucht en nageboorte(!) en een goede anamese (leeftijd ooi, aantal verwerpers, problemen in voorgaande jaren, etc) te worden ingestuurd.

Sterfte bij pasgeboren lammeren

Jaarlijks sterft ongeveer 15 % van de lammeren. Een deel wordt dood geboren, een deel sterft in de opfok, maar het grootste deel sterft in de eerste levensweek. De belangrijkste oorzaken van sterfte in de eerste levensweek zijn onderkoeling, gewrichtsontsteking, diarree, lammerdysenterie, kopergebrek en aangeboren afwijkingen. Een aantal van deze aandoeningen kunnen worden voorkomen door goede hygiënemaatregelen te nemen. De belangrijkste maatregel om sterfte te voorkomen is een goede biestvoorziening. Biest is een belangrijke energiebron, zorgt voor stimulatie van de darmactiviteit en verschaft het lam de weerstand die het in de eerste levensweken nodig heeft.

Belangrijke oorzaken van sterfte in de opfok zijn worminfecties, “het bloed” en “zomerlongontsteking”. Om lammeren te beschermen tegen de twee laatste genoemde aandoeningen kunt u uw lammeren laten vaccineren.

Ziekte bij hoogdrachtige oeien

Schapenverlosavond

Op woensdag 11 februari organiseren we voor de laatste keer de schapenverlosavond. Op deze avond vertellen we u over

Website

Aan de website van de praktijk wordt op dit moment volop gewerkt (www.ulp.nu). Uitgebreidere informatie over de bovengenoemde aandoeningen staat op de site.

Voor visites en spoedgevallen kunt u ons bereiken op: 0348- 442653

Openingstijden voor ophalen van medicijnen: maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u één van onze dierenartsen raadplegen tijdens het telefonisch spreekuur op bovenstaand telefoonnummer (op werkdagen van 08:00 tot 09:00 uur)