

Maandag tot en met vrijdag
van 08:00 tot 18:00.
Openingstijden voor ophalen
van medicijnen en spoedgevallen
kunt u ons bereiken op:
0348- 442653



DIERGEENEESKUNDIG CENTRUM

"Het Westelijk Weidegebied"

Juli 2006, nummer 4



Nieuwsbrief kleine herkauwer



Inleiding

In deze aflevering van de nieuwsbrief worden de actualiteiten van het komende kwartaal besproken. Zo gaan er de laatste tijd veel verhalen over de rammenverordening! Daarnaast zijn we veel schapen met myiasis tegengekomen.

In de nabije toekomst kunnen we de leverbotprognose verwachten en ook de dekperiode zal aankomend kwartaal weer beginnen.

Tenslotte zal in deze nieuwsbrief kobaltgebrek als mogelijk oorzaak van groeivertraging bij lammeren worden beschreven.

Leverbot

Ieder najaar brengt de Werkgroep Leverbotprognose haar prognose uit. Het is belangrijk om de prognose in de gaten te houden, omdat we hier in een leverbot gevoelig deel van Nederland zitten. Wij zullen in de volgende nieuwsbrief ook weer terugkomen op de prognose. Wij adviseren u om uw schapen in het najaar (september) voor de dekperiode te behandelen tegen maag-, darm- en longwormen. Deze behandeling kan het best worden gecombineerd met een behandeling tegen leverbot. Afhankelijk van de prognose adviseren wij u om uw schapen in december/januari nogmaals tegen leverbot te behandelen.

Myiasis (Vliegenlarveziekte)

Myiasis is een ziekte die we regelmatig tegenkomen. Het probleem is momenteel de behandeling van dieren met myiasis. Het probleem is dat de goedwerkende middelen neocidol en sebacil niet te verkrijgen zijn. Alternatieven zijn er bijna niet voor handen.

Meest geadviseerde behandeling: Wol wegknippen waar de maden zitten en zorgen dat er geen maden achterblijven. Vervolgens de wond schoonmaken en desinfecteren en eventueel breed spectrum antibiotica toedienen.

Preventief kan er ook worden gewerkt.

Dekseizoen

Bij de meeste schapenhouders zal de ram in september/oktober weer bij de schapen worden gejaagd, zodat ongeveer 5 maanden min 5 dagen later de eerste lammeren worden geboren (draagtijd: 144-147 dagen).

Het is verplicht om een scrapie-ongevoelige ram (ARR/ARR) in te zetten.

Om problemen in het voorjaar te voorkomen is het belangrijk dat de uiers van de schapen worden gecontroleerd voordat de oaien bij de ram worden gelaten. Het genezen van een chronische uierontsteking is bij schapen (bijna) onmogelijk.

Laat alleen oaien die in een correcte conditie zijn bij de ram. Oilammeren die bij de ram worden gelaten dienen voldoende zwaar te zijn. Het correcte gewicht is afhankelijk van het ras.

Om het aflammerseizoen te verkorten bestaat de mogelijkheid om oaien te sponzen. De oaien worden hierdoor gesynchroniseerd en zullen binnen enkele dagen, na het verwijderen van de sponzen, gedekt worden. Er zitten wel een aantal voorwaarden aan het sponzen. Zo kan een volwassen ram in de regel niet meer dan 4-6 oaien per dag dekken. Ook zal de dekperiode iets meer tijd van de schapenhouder vragen, maar dit wordt ruimschoots terugbetaald in het aflammerseizoen!

Kobaltgebrek bij lammeren

De aandoening kobaltgebrek of vitamine B12-tekort, wordt meestal gezien bij lammeren na het spenen. De symptomen kunnen nogal variëren. Zo kunnen de lammeren groeivertraging oplopen, een dorre vacht hebben, achterblijven na opjagen en soms verschijnselen van "zonnebrand" vertonen.

Als behandeling kan vitamine B12 per injectie worden toegediend, ook het geven van krachtvoer is een onderdeel van de therapie.

Het gebrek aan kobalt zorgt ook voor een weerstandsvermindering, hierdoor zijn lammeren vatbaarder voor andere ziekten en men moet hier dus alert op zijn.

Rammenverordening

Ondanks de vele verhalen die de ronde gaan zal de rammenverordening aankomend dekseizoen gewoon van kracht zijn. Het is dus verplicht om een scrapie-ongevoelige ram (ARR/ARR) in te zetten.