

Openingstijden voor ophalen van medicijnen:  
Maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00.

Voor visites en spoedgevallen kunt u ons bereiken op:  
0348- 442653



DIERGEENEESKUNDIG CENTRUM

"Het Westelijk Weidegebied"

Oktober 2007, nummer 9



# Nieuwsbrief kleine herkauwer



## Inleiding

Het afgelopen kwartaal zijn onze werkzaamheden in de praktijk voornamelijk gerelateerd aan Bluetongue (BT) geweest. We zagen veel meer zieke schapen dan normaal en helaas gingen er ook nogal wat dieren dood. Onze ervaring is dat veel schapen bij snel ingrijpen goed opknapten, maar andere schapen redden het niet ondanks adequaat handelen. Evengoed raden wij aan om schapen met BT zo spoedig mogelijk te behandelen met ontstekingsremmers en antibiotica.

Ondanks de greep die BT op de schapenhouderij heeft, zijn er meer zaken waar we dit kwartaal op moeten letten.

Zo is het ook weer het seizoen, waarin aandacht aan leverbot moet worden besteed.

Daarnaast zal bij de meeste schapenhouders de dekram weer bij de oaien worden gelaten. Hierbij zijn er een aantal zaken die belangrijk zijn om aandacht aan te besteden bij de aanschaf van een ram op een ander bedrijf.

Ook wolschurft en Coxiella-abortus zijn zaken die de komende tijd weer problemen kunnen veroorzaken.

## Leverbot

Zoals de meeste houders van kleine herkauwers weten kan leverbot bij ons in het praktijkgebied voor problemen zorgen. De leverbot wordt in de regel na een periode van regen afgezet op het land door besmette slakken. Omdat we een relatief natte zomer hebben gehad, wordt er een hoge infectiedruk verwacht.

Het is dan ook aan te bevelen om uw dieren dit najaar tijdig te behandelen en de behandeling, afhankelijk van de definitieve prognose, in januari te herhalen.

Wij raden u aan om uw schapen tegen leverbot te beschermen.

## Wolschurft

Wolschurft is een aandoening die steeds vaker voorkomt. Wolschurft wordt veroorzaakt door een mijt (parasiet) en zorgt voor jeuk, onrust en wuluitval bij schapen. De aandoening wordt vaak veroorzaakt door een aangekocht dier (bijv. dekram), maar kan ook door kraaien worden overgebracht.

Wolschurft is een aandoening die vaak moeilijk te behandelen is. Er zijn twee mogelijke behandelingen: De eerste is om de schapen te dompelen in een dompelbad met.

Let op! De schapen moeten voldoende lang in het bad verblijven en de concentratie werkzame stof moet voldoende hoog blijven. De tweede mogelijkheid is om de schapen te behandelen met een injecteerbaar ivermectine-preparaat. Deze behandeling moet wel na 7-10 dagen worden herhaald! Bij de eerste behandeling worden namelijk alleen de bloedzuigende mijten gedood en de neten (eitjes) blijven aanwezig. Deze zijn, als ze uitkomen, bij de volgende behandeling bloedzuigend en dus gevoelig voor de behandeling.

## Dekram

Het dekseizoen is voor de meeste schapenhouders weer begonnen of aanstaande. Het is niet meer verplicht om een scrapie-vrije ram in te zetten. Wij raden u wel aan om gebruik te maken van een ARR/ARR-dekram, gezien de gevolgen bij het aantonen van een dier met scrapie op uw bedrijf. Controleer of de oaien niet terug komen (herdekt worden) door gebruik te maken van een dektuig. Zet een aangekochte ram altijd twee weken in quarantaine.

Let op! Een ram die ziek is geweest (bijv. BT) kan 6-8 weken onvruchtbaar zijn.

## Coxiella-abortus (Q-koorts)

In de landelijke dagbladen wordt steeds vaker vermeld, dat er mensen ziek worden door Q-koorts. In Brabant is er zelfs sprake geweest van een uitbraak. Op dit moment wordt er een onderzoek naar de oorzaak ingesteld.

Het is bekend dat Q-koorts bij kleine herkauwers abortus kan veroorzaken. In geval van abortus raden wij u aan om de vrucht en nageboorte te laten onderzoeken. Daarnaast is het belangrijk om bij ziekteverschijnselen bij u zelf, uw huisarts op de hoogte te stellen van eventuele abortussen bij schapen/geiten. Zwangere vrouwen kunnen beter helemaal niet in contact komen met aflammerende kleine herkauwers!