



mei 2011 - Het is weer voorjaar! Voor velen van u zal het aflammerseizoen grotendeels achter de rug zijn, zodat de schapen het land weer in kunnen en u kan genieten van uw welverdiende nachtrust! In deze nieuwsbrief hebben we voor u weer een aantal actuele zaken op een rijtje gezet.

In deze nieuwsbrief:

- Aandachtspunten,
- (ont)wormen bij van schapen en geiten,
- blauwtong,
- Q-koorts,
- nieuwsbrief digitaal!

(ONT)WORMEN VAN SCHAPEN EN GEITEN

Het voorkomen van resistentie tegen ontwormingsmiddelen is van groot belang bij schapen en geiten. Dit wordt hoofdzakelijk bepaald door een goed gebruik van deze middelen. Daarom hebben we het wormbeleid voor u op een rijtje gezet.

Volwassen schapen en geiten hoeven in de regel maar eenmaal per jaar ontwormd te worden, indien ze regelmatig worden omgeweid. Wanneer u twijfelt kunt u in de zomermaanden mestonderzoek laten doen. Het beste moment om de volwassen schapen te behandelen is in het voorjaar, voordat de oaien met de lammeren naar buiten gaan.



AANDACHTSPUNTEN KOMENDE MAANDEN:

- april/mei:**
- Oaien ontwormen voordat ze met de lammeren naar buiten gaan.
 - Enten tegen blauwtong.
 - Voorkom Clostridiuminfectie (het Bloed): vermijd abrupte veranderingen in voer (onbeperkt brok, malse wei).
- juni:**
- Lammeren spenen en mestonderzoek doen.
 - Plan van aanpak voor ontwormen opstellen.

Voor het ontwormen van volwassen schapen en geiten zijn ontwormingspillen ongeschikt, omdat de meest voorkomende wormen hier ongevoelig voor zijn. Een wormmiddel met daarin een ivermectine heeft de voorkeur, hiervoor hebben wij verschillende middelen beschikbaar. Het ontwormen van lammeren vraagt een andere aanpak. Zorg er in ieder geval voor dat lammeren in het voorjaar niet op een weide komen, waar het afgelopen jaar ook lammeren hebben gelopen. Het is daarom verstandig om lammeren na mestonderzoek en gericht advies te ontwormen. Realiseert u zich dat diarree en eventuele sterfte bij lammeren ook door andere verwekkers zoals virussen, bacteriën en andere parasieten veroorzaakt kan worden.

Het mestonderzoek wordt bij ons op de praktijk gedaan. Om een goede uitslag te krijgen is het belangrijk de mest op goede wijze te verzamelen. De beste manier is als het volgt: verzamel verse mest, deze mag niet langer dan 30 minuten op de grond hebben gelegen! De mest moet van minimaal vijf lammeren zijn. Bewaar het monster in de koelkast en lever het binnen een dag bij ons op de praktijk in. Binnen een dag heeft u al de uitslag van het mestonderzoek met een gericht advies voor uw dieren!

>>

BLAUWTONG: VOOR 1 JUNI ENTEN

Afgelopen jaar is er geen geval van blauwtong in Nederland gemeld. Desondanks adviseren we om uw schapen en geiten wel te laten vaccineren tegen deze ziekte. In de landen om ons heen heerst er nog steeds blauwtong en het ligt daarom voor onze dieren ook nog steeds op de loer.

Ons advies is om uw dieren vóór de zomer te laten vaccineren, zodat ze voor de gevoelige periode met knutten beschermd zijn. Knutten zijn vliegjes die het blauwtongvirus overbrengen. Deze zijn vanaf mei tot september, afhankelijk van het weer aanwezig.

Lammeren geboren uit niet-gevaccineerde oaien kunnen worden gevaccineerd vanaf een leeftijd van 1 maand; lammeren geboren uit wel-gevaccineerde oaien vanaf een leeftijd van 2,5 maand. Een eenmalige vaccinatie volstaat. Schapen die al eerder gevaccineerd zijn hoeven maar eenmalig te worden gevaccineerd. Dit geldt ook voor geiten die eerder gevaccineerd zijn. Zijn geiten nog nooit gevaccineerd, dan moeten zij tweemaal gevaccineerd worden, met een interval van 3-4 weken.

IEDEREEN KAN VACCINEREN TEGEN Q-KOORTS!

Er is dit jaar genoeg entstof beschikbaar voor alle schapen- en geitenhouders die hun dieren willen laten vaccineren tegen Q-koorts. Deze vaccinatie is vrijwillig, maar wij raden u aan, zeker wanneer u met uw dieren fokt of ze komen veel in aanraking met mensen en kinderen, uw dieren tegen Q-koorts te laten vaccineren.

Voor de bedrijven met melkschapen of melkgeiten of bedrijven met een publieke functie (zorgboerderijen en kinderboerderijen), die afgelopen jaar verplicht hebben moeten enten, blijft deze verplichting ook dit jaar gelden. Ons advies voor de Q-koorts vaccinatie is om de dieren te laten enten, voordat ze gedekt worden. De dieren zijn dan gedurende de gehele dracht beschermd. Drachtige dieren mogen überhaupt niet worden gevaccineerd. Dieren die nog nooit geënt zijn, moeten tweemaal geënt worden, met 3-4 weken tussentijd. Vanaf drie weken na de tweede enting kunnen ze bij de ram of bok. Het jaar erop kan bij deze dieren volstaan worden met eenmalige herhalingsvaccinatie.

Komende zomer organiseren wij enkele Q-koorts-entdagen: als u op deze dagen uw dieren laat enten krijgt u korting! Wij proberen zo dit werk op enkele dagen te organiseren, zodat wij zo efficiënt mogelijk met de entstof kunnen werken in verband met de beperkte houdbaarheid. Houdt onze website (www.ulp.nu) en de volgende nieuwsbrief in de gaten voor de data!



NIEUWSBRIEF WORDT OOK DIGITAAL!!

Zoals u van ons gewend bent ontvangt u 4 keer per jaar de nieuwsbrief kleine herkauwer. Dit willen we ook zo houden, maar met ingang van 1 juli 2011 willen we deze ook per mail versturen. Daarnaast kunt u ook de nieuwsbrief en alle voorgaande nieuwsbrieven op de website terugvinden, onder het kopje kleine herkauwer. Wanneer uw e-mailadres nog niet bij ons bekend is en u wilt de nieuwsbrief digitaal ontvangen, willen wij u vragen dit aan ons door te geven.

Mestonderzoek is zinvol als u dieren met problemen hebt. De klachten kunnen onder andere zijn: vermageren, diarree en/of bleke oogslimvliezen. Daarnaast laat u mestonderzoek doen als u van plan bent ze te ontwormen, om te weten of ontwormen op dat moment zinvol is. Wij adviseren om mestonderzoek te doen 4 weken na inscharen op land waarin de afgelopen 3 maanden schapen of lammeren zijn geweid en daar langer dan 2-3 weken hebben gelopen. Wanneer we spreken over de jaarplanning is het zeker aan te raden om in de maanden april t/m oktober om de zes tot acht weken mestonderzoek bij de lammeren te doen! De frequentie van het mestonderzoek is sterk afhankelijk van uw bedrijfssituatie, dit kan u in overleg met uw dierenarts bepalen.

Bij het ontwormen van lammeren (dit geldt natuurlijk ook voor de volwassen dieren) is het erg belangrijk om de juiste dosering toe te passen. Dit is van belang omdat uit de praktijk blijkt dat er regelmatig wordt onder gedoseerd. Hiertoe kunnen de zwaarste lammeren gewogen worden en de bijbehorende dosering moet voor alle lammeren gehanteerd worden. Behalve wanneer er veel gewichtsverschil tussen de dieren zit. Geiten dienen ontwormd te worden met de dubbele dosis van de schapen!

Zoals eerder genoemd is het voorkomen van resistentie tegen wormmiddelen erg belangrijk. In onze praktijk speelt resistentie nog geen grote rol op de bedrijven en zijn de gangbare ontwormingsmiddelen goed werkzaam, mits deze middelen goed worden gebruikt. Hiermee bedoelen we dat de dieren op het juiste moment behandeld moeten worden met het juiste middel en een correcte dosering. Mest onderzoek kan extra informatie geven of ontworming op een bepaald moment noodzakelijk is. Door eerst mestonderzoek uit te laten voeren, sluiten we uit dat dieren worden behandeld, terwijl dat niet nodig is wat resistentie veroorzaakt. Heeft u vragen dan helpen wij u graag met een passend advies voor uw bedrijf. Het blijft immers toch maatwerk!