



Augustus 2011 - Middels deze nieuwsbrief informeren we u over het laatste nieuws en herinneren we u aan een aantal belangrijke zaken. Heeft u opmerkingen of suggesties dan horen wij dat graag.

### In deze nieuwsbrief:

- Varkenssignalen
- Streefwaarde dag doseringen per dierjaar bekend!
- Varkenspest
- Oxytocine

## STREEFWAARDE DAG DOSERINGEN PER DIERJAAR BEKEND!

*In onze vorige nieuwsbrief hebben we uitgelegd dat de ULP voor al haar varkenshouders de dagdosering antibiotica per dierjaar (dd/dj) heeft berekend.*

*De net opgerichte Stichting Diergeneesmiddelen autoriteit heeft inmiddels normen opgesteld aan welke dagdoseringen varkensbedrijven moeten voldoen. Deze staan weergegeven in onderstaande tabel. Aan deze normen zijn ook drie actie niveaus verbonden.*

De streefwaarden voor de varkenshouderij voor 2011 zijn:

	Streefwaarden brancheniveau (in dd/dj)		Kritische grenswaarden individuele bedrijven 2011 (in dd/dj)	
	2009 (referentie)	2011	Signalerings- waarde	Actie- waarde
Zeugen/ biggen	26	20	37	54
Vlees- varkens	16	13	33	53

dd/dj = dagdosering per dierjaar

### Wat betekenen deze waarden?

Op basis van de normen van het SDA-expertpanel kunt u in overleg met één van onze dierenartsen een plan van aanpak formuleren om de reductiedoelstelling te behalen en het gebruik van kritische middelen onder de loep te nemen. Het is aan te bevelen om ook uw andere bedrijfsadviseurs hierbij te betrekken.

Kijk voor meer informatie op <http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/varkenshouder>



#### ACTIEWAARDE

Vanaf dit niveau zijn directe maatregelen noodzakelijk om van antibioticumgebruik snel te verlagen.



#### SIGNALERINGSWAARDE

Vanaf dit niveau verdient het antibioticum nadere aandacht. Wellicht zijn maatregelen nodig.



#### STREEFWAARDE 2011

Bij dit niveau van antibioticum zijn geen directe aanpassingen of maatregelen nodig.

## VARKENSSIGNALEN: VOORAANKONDIGING

*Leer nog beter kijken naar uw varkens, stal en management! Dit najaar zal Kees Scheepens de cursus Varkenssignalen® geven. Dit is een goede cursus voor u en uw medewerkers.*

Varkenssignalen® gaat om eerst kijken, dan denken en pas als laatste doen. Het afzonderlijk zetten van deze stappen lost problemen op en voorkomt bedrijfsblindheid. Kijk voor meer informatie op: [www.farmulaone.nl](http://www.farmulaone.nl)

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neemt u dan contact op met de praktijk.





# VARKENSPEST

***Gelukkig is onze laatste herinnering aan varkenspest alweer enige jaren oud. De dreiging blijft echter onverminderd aanwezig: de recente varkenspest uitbraken in Litouwen tonen dit aan.***

Om verspreiding van deze ziekte te voorkomen verplicht de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren ons tot het volgende:

- Als een varkenshouder varkens behandelt die verschijnselen van een besmettelijke dierziekte\* vertonen, dient hij/zij binnen 24 uur nadat die behandeling is ingesteld, bloed te laten afnemen en insturen ten behoeve van onderzoek op de aanwezigheid van een besmettelijke dierziekte. De dierenarts neemt daarvoor 6 bloedmonsters, die in Lelystad worden onderzocht. Het onderzoek op klassieke varkenspest is gratis, de dierenartskosten en verzendkosten worden door de varkenshouders betaald.
- Als op een bedrijf varkens mogelijk ten gevolge van een besmettelijke dierziekte\* zijn gestorven, dient de eigenaar een representatief aantal van die dieren ter sectie in te sturen ten behoeve van onderzoek op de aanwezigheid van klassieke varkenspest. Het specifieke onderzoek op klassieke varkenspest is gratis.

**Bij bovenstaande acties wordt het bedrijf niet geblokkeerd!**

- Als er een duidelijke verdenking van een besmettelijke dierziekte\* op uw bedrijf is, dient u dat uiteraard direct te melden. De VWA stuurt dan een specialistenteam en het bedrijf is geblokkeerd tot de uitslag van de PCR-test

## \* AANGIFTEPLICHTIGE BESMETTELIJKE DIERZIEKTEN:

- Afrikaanse varkenspest,
- Klassieke varkenspest,
- Ziekte van Aujeszky,
- Mond en Klauwzeer
- SVD (blaasjesziekte),
- Brucellose

Kijk voor de bijbehorende verschijnselen op:  
[www.varkensziekte.nl](http://www.varkensziekte.nl)

gunstig is. Tegenwoordig duurt het slechts 6 uur voor deze testuitslag bekend is, waardoor de tijdsduur van een blokkade minimaal is.

Er vindt ook continue monitoring van klassieke varkenspest plaats in Nederland, door middel van bloedonderzoek of een test op tonsillen van dode dieren. Alle A-, C- en E- bedrijven (sub- en opfokbedrijven) zijn verplicht iedere maand bloedonderzoek te laten doen op klassieke varkenspest. Van alle opgestuurde dieren voor pathologisch onderzoek worden de tonsillen onderzocht op varkenspest.

Als uw varkens niet reageren op een behandeling zoals u gewend bent, neemt u dan contact op met uw dierenarts. Ook als u verschijnselen bij uw varkens ziet die u niet kent, of abnormale combinaties van verschijnselen of andere vragen heeft over deze informatie neemt u dan contact op met ons.

# OXYTOCINE

***Geef niet te veel oxytocine in één keer!***

Als zeugen niet goed doorbiggen kan oxytocine helpen om de tussen-big-tijd te verkorten. Dit middel zorgt ervoor dat de baarmoeder gaat samentrekken, dus dit kan bij overdosering tot kramp van de baarmoeder en verstikking van biggen leiden.

We hebben gemerkt dat overdosering nog regelmatig voorkomt. Belangrijk dus:

- eerst voelen of er geen big klem zit
- 1 cc oxytocine tijdens werpen
- bij onvoldoende resultaat: herhalen van injectie na 15-30 minuten