

Lammeren	Dosering	Frequentie per dag	Duur in aantal dagen	Toedieningswijze	Wachttijd in dagen Vlees	
<b>Diarree (eerste levensweken)</b>						
<b>Eurolectrol</b>	RegNL 1286 vrij	2,5 gr/100 ml per dier	6x	1	In de bek	0
<b>Diarree</b>						
Vanaf een leeftijd van 3 weken is coccidiose een veel voorkomende oorzaak van diarree bij lammeren. Vanaf een leeftijd van 6 weken kunnen worminfecties de oorzaak zijn. Coccidiose en een worminfectie kunnen aangetoond worden in de mest. Laat eerst mestonderzoek doen op de praktijk en behandel op basis van de uitslag!						
Als de lammeren niet meer drinken, dierenarts bellen voor advies. Vocht is essentieel voor de lammeren, zonodig via een sonde of infuus. Belangrijk is de lammeren melk te blijven geven, afgewisseld met de electrolytenoplossing. Geef de lammeren het vocht in kleine hoeveelheden: 100-150 ml per keer, 6-8 per dag.						
<b>Ontstoken oog *</b>						
<b>Opticlox</b>	RegNI 3432 UDD	1/6 injector per oog	3x	3	in het oog	0
* Vaak is entropion de oorzaak van de ontsteking. De ooglidrand zo naar binnen gekruld en daarmee komen de haren van het ooglid op de oogbol te liggen en zodoende een ontsteking hier-van veroorzaken. Bel uw dierenarts om een krammetje te laten plaatsen, het gaat meestal niet vanzelf over en kan tot ernstige beschadigingen leiden.						
<b>Ontstoken navel</b>						
<b>Depocilline</b>	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20-25 kg	1x	3	in de spier	7
<b>Gewrichtsontsteking</b>						
<b>Depocilline en Rimadyl Cattle</b>	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20-25 kg	1x	3	in de spier	7
	RegNL 10130 UDA	1 ml/ 35 kg	1x	1	Onder de huid	28
<b>Zere bekjes</b>						
<b>CTC Spray</b>	RegNL 9013 UDD	3 sec sprayen	2x	3	Op de huid	0
<b>Depocilline</b>	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20-25 kg	1x	5	Onder de huid	7
De infectie gaat vanzelf over en meestal hoeft er niet of alleen met CTC-Spray behandeld te worden. Alleen ernstige gevallen behandelen met depocilline. Handschoenen dragen bij het behandelen van de dieren om infectie van uzelf te voorkomen.						

Lammeren & Ooien	Dosering	Frequentie per dag	Duur in aantal dagen	Toedieningswijze	Wachttijd in dagen Vlees	
<b>Longontsteking</b>						
<b>Depocilline en Rimadyl Cattle</b>	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20-25 kg	1x	5	in de spier	7
	RegNL 10130 UDA	1 ml/ 35 kg	1x	1	Onder de huid	28
Als schapen longontsteking hebben, is het meestal zomerlongontsteking. Dieren sterven hier vaak binnen een dag aan. Raadpleeg bij plots dode dieren en/of verdenking van zomerlongontsteking altijd de dierenarts. Vaccineren tegen zomerlongontsteking is mogelijk.						
<b>Pijnstilling</b>						
<b>Rimadyl Cattle</b>	RegNL 10130 UDA	1 ml/ 35 kg	1x	1	Onder de huid	28
<b>Novem</b>	RegNI 10219 URA	1 ml/ 25 kg	1x	1	Onder de huid	28

Vaccinaties	Dosering	Frequentie per dag	Duur in aantal dagen	Toedieningswijze	Wachttijd in dagen Vlees
<b>Ooien</b>					
<b>Heptavac*</b>	Het bloed & zomerlongontsteking		4-6 weken voor aflammeren	Jaarlijks	
<b>Covexin*</b>	Het bloed		6-2 weken voor aflammeren	Jaarlijks	
<b>Footvax*</b>	Rotkreupel		4 weken voor aflammeren	Iedere 4 maanden	
*Advies om ooien voor het aflammeren te vaccineren ivm doorgeven van de antistoffen.					
<b>Lammeren</b>					
<b>Heptavac</b>	Het bloed & zomerlongontsteking		vanaf 3 weken leeftijd	na 4-6 weken herhalen	
<b>Covexin</b>	Het bloed		vanaf 2 weken leeftijd	na 4-6 weken herhalen	
<b>Ooien &amp; lammeren</b>					
<b>Coxevac</b>	Q-koorts		Vraag uw dierenarts om het beste advies voor uw bedrijf		
<b>Vaccinaties moeten worden toegediend door een dierenarts.</b>					

Ooien	Dosering	Frequentie per dag	Duur in aantal dagen	Toedieningswijze	Wachttijd in dagen Vlees
<b>Diarree</b>					
Diarree bij volwassen dieren kan worden veroorzaakt door een worminfectie. Worminfecties kunnen aangetoond worden in de mest. Laat mestonderzoek doen op de praktijk en behandel op basis van de uitslag! Regelmatig omweiden kan worminfecties voorkomen. Vraag uw dierenarts om advies!					
<b>Uierontsteking</b>					
<b>Engemycine 10% en</b>	RegNL 8291 UDD	1 ml/ 12,5 kg	1x	3	Onder de huid 18
<b>Rimadyl Cattle</b>	RegNL 10130 UDA	1 ml/ 35 kg	1x	1e dag	Onder de huid 28
Uierinjectoren bestemd voor runderen kunnen gebruikt worden maar kunnen ook het slotgat beschadigen en secundaire infecties veroorzaken. Rimadyl bijspuiten als pijnstiller en ter bevordering van de eetlust.					
<b>Blauw uier</b> Acut, uierhelft koud en blauw					
Overleg met dierenarts					
<b>Baarmoederontsteking</b>					
<b>Engemycine</b>	RegNL 8291 UDD	1 ml/ 12,5 kg	1x	3	In de spier 18
<b>Ontstoken wond</b>					
<b>Depocilline</b>	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20-25 kg	1x	3	Onder de huid 7
<b>Slepende melkziekte</b>					
<b>Propyleenglycol*</b>	RegNL 2628 vrij	30 ml per dier	2x	4	In de bek 0
* Advies om Propyleenglycol aan te lengen met 30 cc water.					
Bij schapen die zeer ernstige slepende melkziekte hebben kan evt. het lammeren opgewekt worden. Overleg hierover met de dierenarts.					
<b>Rotkreupel</b>					
<b>CTC Spray</b>	RegNL 9013 UDD	3 sec sprayen	2x	3	Op de huid 0
<i>Bij ernstige gevallen:</i>					
<b>Engemycine</b>	RegNL 8291 UDD	1 ml/ 12,5 kg	1x	3	In de spier 28
Aanvullende maatregelen zijn: klauwtjes bekappen, dieren naar droge, schone stal/wei en vaccineren.					
<b>Oogontsteking</b>					
<b>Opticlox</b>	RegNL 3432 UDD	1/6 injector per oog	3x	3	In het oog 0
<b>Rimadyl Cattle</b>	RegNL 10130 UDA	1 ml/ 35 kg	1x	1	Onder de huid 28
Dieren met oogontsteking kunnen het beste apart van de rest gezet worden, en in de stal omdat ze niet goed tegen fel licht kunnen. Behandeling met antibiotica heeft niet altijd effect. Bij ernstige oogontsteking wel een pijnstiller spuiten (Rimadyl). Let op dat de dieren, doordat ze slecht zien, niet verdrinken.					
<b>Zwaar aflammeren</b>					
<b>Depocilline en</b>	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20-25 kg	1x	3	Onder de huid 7
<b>Rimadyl Cattle</b>	RegNL 10130 UDA	1 ml/ 35 kg	1x	1	Onder de huid 28
<b>Ontwormen</b>					
Neem contact op met uw dierenarts voor een passend advies.					

Lees altijd goed de bijsluiter, wachttijden kunnen wijzigen.