

Lammeren	Dosering	Frequentie per dag	Duur in aantal dagen	Toedieningswijze	Wachtijd in dagen Vlees
----------	----------	--------------------	----------------------	------------------	-------------------------

Diarree (eerste levensweken)

Dierenarts bellen voor advies. Vocht is essentieel voor de lammeren, zonodig via een sonde of infuus. Belangrijk is om de lammeren melk te blijven geven, afgewisseld met de electrolytenoplossing. Geef de lammeren het vocht in kleine hoeveelheden: 100-150 ml per keer, 6-8 per dag.

Diarree (vanaf 3 weken)

Vanaf een leeftijd van 3 weken is coccidiose een veel voorkomende oorzaak van diarree bij lammeren. Vanaf een leeftijd van 6 weken kunnen worminfecties de oorzaak zijn. Coccidiose en een worminfectie kunnen aangetoond worden in de mest. Laat eerst mestonderzoek doen op de praktijk en behandel op basis van de uitslag!

Ontstoken oog *

Opticlox	RegNI 3432 UDD	1/6 injector per oog	3x	3	in het oog	0
-----------------	----------------	----------------------	----	---	------------	---

* Vaak is entropion de oorzaak van de ontsteking. De ooglidrand wordt zo naar binnen gekruld waardoor de haren van het ooglid op de oogbol komen te liggen en kunnen zodoende een ontsteking veroorzaken. Bel uw dierenarts om een krammetje te laten plaatsen. Het gaat meestal niet vanzelf over en kan tot ernstige beschadigingen leiden.

Ontstoken navel

Depocilline*	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20-25 kg	1x	3	in de spier	7
---------------------	----------------	----------------	----	---	-------------	---

* Vaak is een langere behandeling noodzakelijk. Omdat dit een 'off-label' behandeling is, moet dit altijd in overleg met de dierenarts. U wordt dan ook geadviseerd in welke wachttijd u moet aanhouden.

Gewrichtsontsteking

Depocilline en Novem 20 mg/ml	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20-25 kg	1x	3	in de spier	7
	RegNL 10219 UDA	1 ml/ 25 kg	1x	1	Onder de huid	28

Zere bekjes

CTC Spray	RegNL 9013 UDD	3 sec sprayen	2x	3	Op de huid	0
Depocilline	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20-25 kg	1x	3	Onder de huid	7

De infectie gaat vanzelf over en meestal hoeft er niet of alleen met CTC-Spray behandeld te worden. Alleen ernstige gevallen behandelen met depocilline. Handschoenen dragen bij het behandelen van de dieren om infectie van uzelf te voorkomen.

Lammeren & Ooien

Longontsteking

Depocilline* en Novem 20 mg/ml	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20-25 kg	1x	3*	in de spier	7
	RegNL 10219 UDA	1 ml/ 25 kg	1x	1	Onder de huid	28

Als schapen longontsteking hebben, is het meestal zomerlongontsteking. Dieren kunnen binnen een dag sterven. Raadpleeg bij plots dode dieren en/of verdenking van zomerlongontsteking altijd de dierenarts. Vaccineren tegen zomerlongontsteking is mogelijk.

* Vaak is een langere behandeling noodzakelijk. Omdat dit een 'off-label' behandeling is, moet dit altijd in overleg met de dierenarts. U wordt dan ook geadviseerd in welke wachttijd u moet aanhouden.

Pijnstilling

Novem	RegNI 10219 URA	1 ml/ 25 kg	1x	1	Onder de huid	28
Rimadyl Cattle	RegNL 10130 UDA	1 ml/ 35 kg	1x	1	Onder de huid	28

Vaccinaties

Ooien

Ooien	Vaccinaties moeten worden toegediend door een dierenarts.
Heptavac*	Het bloed & zomerlongontsteking
Covexin*	Het bloed
Footvax	Rotkreupel

*Advies om ooien voor het aflammeren te vaccineren i.v.m. doorgeven van de antistoffen.

Lammeren

Heptavac	Het bloed & zomerlongontsteking	vanaf 3 weken leeftijd	na 4-6 weken herhalen
Covexin	Het bloed	vanaf 2 weken leeftijd	na 4-6 weken herhalen

Ooien & lammeren

Coxevac	Q-koorts	Vraag uw dierenarts om het beste advies voor uw bedrijf
----------------	----------	---

Ooien	Dosering	Frequentie per dag	Duur in aantal dagen	Toedieningswijze	Wachttijd in dagen Vlees
Diarree					
Diarree bij volwassen dieren kan worden veroorzaakt door een worminfectie. Worminfecties kunnen aangetoond worden in de mest. Laat mestonderzoek doen op de praktijk en behandel op basis van de uitslag! Regelmatig omweiden kan worminfecties voorkomen. Vraag uw dierenarts om advies!					
Uierontsteking					
Engemycine 10% en	RegNL 8291 UDD	1 ml/ 12,5 kg	1x	3	Onder de huid 18
Novem 20 mg/ml	RegNL 10219 UDA	1 ml/ 25 kg	1x	1	Onder de huid 28
Overleg altijd met uw dierenarts voordat u een uierinjector gebruikt bestemd voor rundvee. Deze injectoren kunnen namelijk het slotgat beschadigen en secundaire injecties veroorzaken. Novem bijspuiten als pijnstiller en ter bevordering van de eetlust.					
Blauw uier (acuut, uierhelft koud/blauw)					
Overleg met dierenarts					
Baarmoederontsteking					
Engemycine	RegNL 8291 UDD	1 ml/ 12,5 kg	1x	3	In de spier 18
Ontstoken wond					
Depocilline	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20-25 kg	1x	3	Onder de huid 7
Slepende melkziekte					
Propyleenglycol*	RegNL 2628 vrij	30 ml per dier	2x	4	In de bek 0
* Advies om Propyleenglycol aan te lengen met 30 cc water. Bij schapen die zeer ernstige slepende melkziekte hebben kan evt. het lammeren opgewekt worden. Overleg hierover met de dierenarts.					
Rotkreupel					
CTC Spray	RegNL 9013 UDD	3 sec sprayen	2x	3	Op de huid 0
Bij ernstige gevallen:					
Engemycine	RegNL 8291 UDD	1 ml/ 12,5 kg	1x	3	In de spier 28
Aanvullende maatregelen zijn: klauwen bekappen, dieren naar droge, schone stal/wei en vaccineren.					
Oogontsteking					
Opticlox	RegNL 3432 UDD	1/6 injector per oog	3x	3	In het oog 0
Novem 20 mg/ml	RegNL 10219 UDA	1 ml/ 25 kg	1x	1	Onder de huid 28
Dieren met oogontsteking kunnen het beste apart van de rest in de stal worden gezet, omdat ze niet goed tegen fel licht kunnen. Behandeling met antibiotica heeft niet altijd effect. Bij ernstige oogontsteking wel een pijnstiller spuiten (Novem). Let op dat de dieren, doordat ze slecht zien, niet verdrinken.					
Zwaar aflammeren					
Depocilline en	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20-25 kg	1x	3	Onder de huid 7
Novem 20 mg/ml	RegNL 10219 UDA	1 ml/ 25 kg	1x	1	Onder de huid 28
Ontwormen					
Neem contact op met uw dierenarts voor een passend advies.					

Lees altijd goed de bijsluiter, wachttijden kunnen wijzigen.