



DIARREE PROTOCOL JONGVEE

Voor alle kalveren met diarree geldt: warme (eventueel warmtelamp), droge en tochtvrije ligplaats.

Wil het kalf met diarree nog zelf drinken?

Ja

Nee

Ernstig ziek kalf: ULP bellen voor infuus !

Matig ziek kalf: behandeling volgens leeftijdscategorie en het toedienen van Novem wordt geadviseerd*

Elke leeftijd: voedingsdiarree

VOCHTTHERAPIE: gedurende 1-3 dagen, afhankelijk van de ernst en de duur van de diarree, melk en elektrolyten afwisselen om de drie uur volgens hier vermeld schema. Daarna geleidelijk overstappen op oude rantsoen.

07.00 uur	1 liter melk
10.00 uur	1,5-2 liter CalfLyte Plus* (elektrolyten)
13.00 uur	1 liter melk
16.00 uur	1,5-2 liter CalfLyte Plus
19.00 uur	1 liter melk
21.00 uur	1,5-2 liter CalfLyte Plus

Eerste levensweek: Coli

- Vochttherapie
- en alleen bij een erg ziek, slap en suf kalf: Diatrim*

Vanaf 4 dagen t/m 3 weken leeftijd

Virusdiarree

- Vochttherapie
- en alleen bij erg ziek, slap en suf kalf: Diatrim*

en/of

Cryptosporidium: alleen behandelen na diagnose door mestonderzoek en/of op basis van voorgeschiedenis.

- Vochttherapie en
- Halocur*

Vanaf 3 weken leeftijd: **Coccidiose:** alleen behandelen na diagnose door mestonderzoek en/of op basis van voorgeschiedenis.

- Vochttherapie of vers water in hok ter beschikking stellen
- en Cevazuril* of Vecoxan* (afhankelijk van het op uw bedrijfsbehandelplan gekozen product)

Neem bij aanhoudende problemen en/of slecht reageren op de behandeling contact op met de dierenartsen van de ULP voor aanvullende diagnostiek en advies op maat.

*zie "bedrijfsbehandelplan jongvee" voor het juiste gebruik van deze producten.