

Lammeren	Dosering	Frequentie per dag	Duur in aantal dagen	Toedieningswijze	Wachtijd in dagen Vlees
----------	----------	--------------------	----------------------	------------------	-------------------------

Diarree (eerste levensweken)

Diatrim	RegNL 123480 UDD	1 ml/8 kg	2x	3-5	in de spier	30
----------------	------------------	-----------	----	-----	-------------	----

Dierenarts bellen voor advies. Bij lammeren met diarree is het van belang aandacht te besteden aan de algehele hygiëne. Daarnaast speelt biest voorziening een essentiële rol bij het voorkomen van veel diarree problemen.

Diarree (vanaf 3 weken)

Vanaf een leeftijd van 3 weken is coccidiose een veel voorkomende oorzaak van diarree bij lammeren. Vanaf een leeftijd van 6 weken kunnen worminfecties de oorzaak zijn. Coccidiose en een worminfectie kunnen aangetoond worden in de mest. Laat eerst mestonderzoek doen op de praktijk en behandel op basis van de uitslag!

Ontstoken oog *

Opticlox	RegNL 3432 UDD	Streepje in het oog	3x	3	in het oog	0
-----------------	----------------	---------------------	----	---	------------	---

* Vaak is entropion de oorzaak van de ontsteking bij jonge lammeren. De ooglidrand wordt zo naar binnen gekruld waardoor de haren van het ooglid op de oogbol komen te liggen en kunnen zodoende een ontsteking veroorzaken. Bel uw dierenarts om een krammetje te laten plaatsen. Het gaat meestal niet vanzelf over en kan tot ernstige beschadigingen leiden.

Ontstoken navel

Depocilline	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20 kg	1x	3	in de spier	7
--------------------	----------------	-------------	----	---	-------------	---

Gewrichtsontsteking

Depocilline en	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20 kg	1x	3	in de spier	7
Novem 20	RegNL 10219 URA	1 ml/ 20 kg	1x	1	Onder de huid	28

Zere bekjes

CTC Spray	RegNL 9013 UDD	3 sec sprayen	1-2x	3	Op de huid	0
Depocilline	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20 kg	1x	3	Onder de huid	7

De infectie gaat vanzelf over en meestal hoeft er niet of alleen met CTC-Spray behandeld te worden. Alleen ernstige gevallen behandelen met depocilline. Handschoenen dragen bij het behandelen van de dieren om infectie van uzelf te voorkomen.

Lammeren & Ooien

Longontsteking

Depocilline* en	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20 kg	1x	3*	in de spier	7
Novem 20	RegNL 10219 URA	1 ml/ 20 kg	1x	1	Onder de huid	23

Als schapen longontsteking hebben, is het meestal zomerlongontsteking. Dieren kunnen binnen een dag sterven. Raadpleeg bij plots dode dieren en/of verdenking van zomerlongontsteking altijd de dierenarts. Vaccineren tegen zomerlongontsteking is mogelijk.

* Vaak is een langere behandeling noodzakelijk. Omdat dit een 'off-label' behandeling is, moet dit altijd in overleg met de dierenarts. U wordt dan ook geadviseerd in welke wachttijd u moet aanhouden.

Clostridium Neem contact op met de dierenarts bij meerdere dieren met verschijnselen, evt. noodvaccinatie toepassen

Depocilline	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20 kg	1x	3	in de spier	7
--------------------	----------------	-------------	----	---	-------------	---

Pijnstilling

Novem 20	RegNL 10219 URA	1 ml/ 20 kg	1x	1	Onder de huid	23
Rimadyl Cattle	RegNL 10130 URA	1 ml/ 35 kg	1x	1	Onder de huid	32

Vaccinaties

Ooien Vaccinaties moeten worden toegediend door een dierenarts.

Heptavac*	Het bloed & zomerlongontsteking	4-6 weken voor aflammeren	Jaarlijks
Covexin*	Het bloed	6-2 weken voor aflammeren	Jaarlijks
Footvax	Rotkreupel	min. 4 weken voor aflammeren	ledere 4 maanden

*Advies om ooien voor het aflammeren te vaccineren i.v.m. doorgeven van de antistoffen.

Lammeren

Heptavac	Het bloed & zomerlongontsteking	vanaf 3 weken leeftijd	na 4-6 weken herhalen
Covexin	Het bloed	vanaf 2 weken leeftijd	na 4-6 weken herhalen

Ooien & lammeren

Bultavo	Blauwtong	Vraag uw dierenarts om het beste advies voor uw bedrijf
Coxevac	Q-koorts	Vraag uw dierenarts om het beste advies voor uw bedrijf
Ecthybel	Zere bekjes	Vraag uw dierenarts om het beste advies voor uw bedrijf

Lees altijd goed de bijsluiter, wachttijden kunnen wijzigen.

Ooien		Dosering	Frequentie per dag	Duur in aantal dagen	Toedieningswijze	Wachttijd in dagen Vlees
Uierontsteking						
Engemycine 10% en	RegNL 8291 UDD	1 ml/ 12,5 kg	1x	3	Onder de huid	18
Novem 20	RegNL 10219 URA	1 ml/ 20 kg	1x	1	Onder de huid	23
Overleg altijd met uw dierenarts voordat u een uierinjector gebruikt bestemd voor rundvee. Deze injectoren kunnen namelijk het slotgat beschadigen en secundaire injecties veroorzaken. Novem bijspuiten als pijnstiller en ter bevordering van de eetlust.						

Blauw uier (acuu, uierhelft koud/blauw)
Overleg met dierenarts

Baarmoederontsteking						
Engemycine 10% en	RegNL 8291 UDD	1 ml/ 12,5 kg	1x	3	Onder de huid	18
Novem 20	RegNL 10219 URA	1 ml/ 20 kg	1x	1	Onder de huid	23

Ontstoken wond						
Depocilline en	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20 kg	1x	3	Onder de huid	7
Novem 20	RegNL 10219 URA	1 ml/ 20 kg	1x	1	Onder de huid	23

Slepende melkziekte						
Propyleenglycol	RegNL 2628 vrij	30 ml per dier	2x	4	In de bek	0

Rotkreupel						
CTC Spray	RegNL 9013 UDD	3 sec sprayen	2x	3	Op de huid	0
Bij ernstige gevallen:						
Engemycine	RegNL 8291 UDD	1 ml/ 12,5 kg	1x	3	In de spier	18
of Alamycine LA	RegNL 2738 UDD	1 ml/10 kg	1x	1	in de spier	35
en Novem 20	RegNL 10219 URA	1 ml/ 20 kg	1x	1	Onder de huid	23
Rotkreupel is een gecompliceerde aandoening, neem voor advies contact op met de dierenarts.						

Oogontsteking						
Opticlox	RegNL 3432 UDD	1/6 injector per oog	3x	3	In het oog	0
Novem 20	RegNL 10219 URA	1 ml/ 20 kg	1x	1	Onder de huid	23
Dieren met oogontsteking kunnen het beste apart van de rest in de stal worden gezet, omdat ze niet goed tegen fel licht kunnen. Behandeling met antibiotica heeft niet altijd effect. Bij ernstige oogontsteking wel een pijnstiller spuiten (Novem). Let op dat de dieren, doordat ze slecht zien, niet verdrinken.						

Zwaar aflammeren						
Depocilline en	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20-25 kg	1x	3	Onder de huid	7
Novem 20	RegNL 10219 URA	1 ml/ 20 kg	1x	1	Onder de huid	23

Abortus
Neem contact op met de dierenarts

Hersenvliestontsteking*						
*Neem bij een ernstige infectie contact op met de praktijk						
Depocilline of	RegNL 4259 UDD	1 ml/ 20-25 kg	1x	3	Onder de huid	7
Engemycine	RegNL 8291 UDD	1 ml/ 12,5 kg	1x	3	In de spier	18
en Novem 20	RegNL 10219 URA	1 ml/ 20 kg	1x	1	Onder de huid	23

Myiasis*						
*Neem bij een ernstige infectie contact op met de praktijk						
Preventieve vliegenbestrijding						
Spotinor	RegNL 113559 VRIJ	5 ml/ dier	1x	1	Op de huid	35
Clik	RegNL 9938 URA	zie bijsluit	1x	1	Op de huid	40
Matige infectie						
Wassen met Vetozinon		10ml/10L water	1x	1	Dompelen	28

Ontwormen						
Worminfecties kunnen aangetoond worden in de mest. Laat mestonderzoek doen op de praktijk en behandel op basis van de uitslag! Regelmatig omweiden kan worminfecties voorkomen. Vraag uw dierenarts om advies!						

Lees altijd goed de bijsluit, wachttijden kunnen wijzigen.